

Γενικά Μέτρα Μετριασμού Κινδύνων (Για Επαγγελματική χρήση):

- Μη το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια. - Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους για την εφαρμογή καταπολέμησης τρωκτικών. - Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). - Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τις 35 ημέρες χωρίς να προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της μόλυνσης και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής. - Μη χρησιμοποιείτε δολωμάτα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολωμάτα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών. - Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικά στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημειώνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρονται τα παρακάτω: • Μη μετακινείτε ή ανοίγετε. • Περιέχει το τρωκτοκτόνο LIPHADIONE GRAINTECH (difethialone) • Σε περίπτωση σύμβασης, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηρίασης: ων 2107793777. • Επικίνδυνο για την άγρια φύση. - Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξελιφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστηθούν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλή από τον προμηθευτή του προϊόντος. - Μην πλένετε τους σταθμούς δολωμάτων με νερό μεταξύ των εφαρμογών. - Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. - Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό, στην περίπτωση που οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε αποχετευτικά δίκτυα ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ).

Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και ματωμένα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μωλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

Πρώτες Βοήθειες: - **Δερματική έκθεση:** Ξέπλυμα του δέρματος με νερό και στη συνέχεια πλύσιμο με νερό και σαπούνι. - **Έκθεση οφθαλμών:** Εξβγάλετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης των οφθαλμών ή νερό και κρατήστε τα βλεφάρια ανοικτά τουλάχιστον 10 λεπτά. - **Έκθεση από το στόμα:** Ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. - Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από ένα κατοικίδιο ζώο. **Αντιδοτό:** Βιταμίνη K1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό. **Τηλ Κέντρου Δηλητηρίασεων: 210 7793777.** Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του: Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε φανόμενα δολωμάτα και τη συσκευασία τους σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης: - Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. - Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής. - Διάρκεια ζωής: 55 μήνες.

Άλλες πληροφορίες: - Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωσή τους από τα τρωκτικά. - Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνσή τους. - Το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.

LIPHADIONE GRAIN'TECH

LIPHADIONE GRAIN'TECH

Διφεθειαλόνη (difethialone)

Ετοιμόχρηστο δόλωμα
σε μορφή σπόρων σιτηρών (AB)

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθεση: Difethialone 0.0025 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99.9975% β/β
Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
χρώμα: κόκκινο

Αριθμός έγκρισης: ΤΠ14-0004/14-3-2012

Μακριά από παιδιά
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει θλάβες στα όργανα (αίμα)
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη
έκθεση.
Επιθλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

«Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης-μυοκτονίας.»

Κάτοχος της έγκρισης:
LIPHATECH S.A.S. Bonnel - BP3,
47480 Pont Du Casse, Γαλλία.



ΔΙΑΝΟΜΗ:
DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E.
Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα, 19300 Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 2849412, 210 5595944 FAX: 210 2850352
email: dgagro@otenet.gr www.dgagro.gr

Καθ. Βάρος: **3** κιλά

Καταστήματα πώλησης: Πωλείται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.
Κατηγορία χρηστών: Επαγγελματίες χρήστες.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταθίου ανάπτυξης): Ποντικοί: Mus musculus - νεαρά και ενήλικα. Αρουραίοι: Rattus norvegicus - νεαρά και ενήλικα Rattus rattus - νεαρά και ενήλικα.
Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί χώροι ή Περιμετρικά των κτιρίων.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής: Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:
Για ποντικούς: μέχρι 50γρ ανά σημείο δόλωσης. **Υψηλή προσβολή:** Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 1.5 μέτρα. **Χαμηλή προσβολή:** Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 2 έως 3 μέτρα.
Για αρουραίους: μέχρι 200γρ ανά σημείο δόλωσης. **Υψηλή προσβολή:** Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 4 έως 5 μέτρα. **Χαμηλή προσβολή:** Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 8 έως 10 μέτρα.

Δηλώσεις προφύλαξης: Μην αναπνεύετε τη σκόνη. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθα- νεστε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οδηγίες χρήσης (Επαγγελματική χρήση): - Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση. - Επιβεβαιώστε τον χώρο πριν την εφαρμογή των δολωμάτων και πραγματοποιήστε επίσημη αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, ο τόπος δραστηριότητάς τους με σκοπό να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής. - Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφοί των τρωκτικών (π.χ. χυμικά δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή των δολωμάτων. - Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστηματικού ολοκληρωμένου διαχειρισμού επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, των μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου. - Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπάν, απομάκρυνση πιθανών εστιών τροφοί και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επαναπροσβολής. - Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγούμενη δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαγούμια, κλπ.). - Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερωθούν στο έδαφος ή σε άλλες κατάλληλες κατασκευές. - Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ότι περιέχουν τρωκτοκτόνο και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται. - Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής του θα πρέπει να σημειώνονται καθ' όλη την περίοδο χρήσης (παρουσία) του στο χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α- βοήθειες που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης. - Το δόλωμα πρέπει να ασφαλίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από τον δολωματικό σταθμό. - Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις επόμενες εφαρμογές, ώστε να ελεγχεται η κατανάλωση του δολωματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται εάν κριθεί απαραίτητο. - Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους. - Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τροφίμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος. - Τα δολωμάτα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν. - Εάν η προσληψη δολωματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την μετεγκατάσταση των σταθμών δόλωσης σε διαφορετικές θέσεις και την πιθανότητα αλλαγής δολωματος. - Εάν μετά από μια περίοδο θεραπείας 35 ημερών τα δολωμάτα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Στην περίπτωση όπου έχουν ελαφρώς άλλες αιτίες μειωμένης αποτελεσματικότητας, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά. Σε αυτήν την περίπτωση συστήνεται η χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτοκτόνου. Επίσης, η χρήση παγιδιών θα πρέπει να εξεταστεί ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου. - Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολωμάτα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται. - Τα δολωμάτα θα πρέπει να τοποθετούνται στους δολωματικούς σταθμούς με τη χρήση δοσομετρητή.